

Dimilin 2 GR[®]

Potraktuj larwy z buta



- Zwalcza larwy
- Zapewnia długotrwały efekt działania
- Łatwy w stosowaniu - granulat do rozsypania

 **Chemtura**
AGROSOLUTIONS™

Dimilin 2 GR[®]

Potraktuj larwy z buta

Produkt biobójczy stosowany do zwalczania owadów (kategoria III; grupa 18). Produkt przeznaczony jest do powszechnego i do profesjonalnego stosowania.

Środek owadobójczy z grupy inhibitorów syntezy chityny, w formie granulatu, do stosowania bezpośredniego lub sporządzania zawiesiny wodnej. Działa żołądkowo i kontaktowo, powoduje zakłócenia rozwoju larwalnego owadów. Przeznaczony do zwalczania much.

Substancja biologicznie czynna: diflubenzuron

Zakres stosowania:

Dimilin 2 GR stosuje się do zwalczania larw much w pomieszczeniach inwentarskich, na przymach i w zbiornikach nawozów organicznych, na wysypiskach odpadów oraz w innych miejscach zasiedlonych przez larwy much.

Instrukcja stosowania - terminy i dawki

Zwalczanie much

Dimilin 2 GR stosuje się przez:

Opryskiwanie lub polewanie wodnym roztworem granulatu – opryskiwaczem lub za pomocą konewki do podlewania z sitkiem.

Dawki: Opryskiwanie 0,25-0,5 kg w 2 litrach wody /10 m²

Polewanie 0,25-0,5 kg w 5 litrach wody/10 m²

Bezpośrednie rozsypywanie granulatu - ręcznie lub za pomocą rozsiewacza granulatów

Dawka: 0,25 kg granulatu na 10m² powierzchni



Pomieszczenia inwentarskie – chlewnie, obory, stajnie, kurniki i inne

Opryskiwanie lub polewanie stosuje się na podłogi ze ściółką ze słomy oraz tam, gdzie część podłogi stanowi ruszt, nad płytkimi kanałami, odprowadzającymi odchody zwierząt na bieżąco. Wyższe dawki stosować na ściółkę, w pomieszczeniach otwartych i przy silnej infestacji larw much. Szczególnie dokładnie opryskiwać miejsca na styku ścian z podłogą. Niższą dawkę stosować na podłogi bez ściółki oraz w warunkach mokrego podłoża.

Rozsypywanie stosuje się w pomieszczeniach dla zwierząt dużych (bukaty, bydło mięsne) trzymanyh luzem na podłodze rusztowej, nad kanałami z wolno odpływającą lub stagnującą gnojowicą.

Nie zaleca się rozsypywania granulatu na ściółkę i na powierzchnie suche.

Wyższe dawki stosować w pomieszczeniach otwartych przy silnej infestacji larw much.

Terminy zabiegów

Pierwszy zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych much, kolejne zabiegi wykonywać w odstępach 3-, 4-tygodniowych.

Przemy obornika, zbiorniki z odchodami, składowiska odpadów organicznych i śmieci.

Rozsypać równomiernie granulatu w ilości 25-50g na 1m²

lub

Opryskiwać w dawce 25-50 g środka w 2 litrach wody na 1m²

lub

Polewać w dawce 25-50 g środka w 5 litrach wody na 1m²

Terminy zabiegów

Pierwszy zabieg wykonać przed pojawieniem się much, kolejne zabiegi wykonywać w odstępach 3-, 4-tygodniowych lub za każdym razem po opróżnieniu zbiornika.