

QUATOVET

Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 4033/10

Płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni gładkich w higienie weterynaryjnej, do dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej i prywatnej oraz do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli poza cyklami hodowlanymi roślin, a także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Wykazuje działanie bakteriobójcze oraz bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych w obszarze weterynaryjnym oraz bakterio-, grzybobójcze w przypadku dezynfekcji powierzchni w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej a także bakterio-, grzybo- i wirusobójcze w dezynfekcji pustych szklarni i tuneli poza cyklami hodowlanymi roślin. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Substancja czynna:

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 250 g/l

Sposoby aplikacji:

QUATOVET zaleca się do stosowania na powierzchniach gładkich wstępnie umytych:

- A. w obszarze weterynaryjnym: na fermach: hodowlanych (stada rodzicielskie), brojlerów, zwierząt futerkowych a także w wylęgarniach, schroniskach dla zwierząt, lecznicach weterynaryjnych.
- B. w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej: do dezynfekcji obszarów i budynków dotkniętych powodzią, a zagrożonych powstaniem epidemii, w piwnicach, zakładach przeróbki odpadów, środkach transportu, magazynach, w pomieszczeniach po zmarłych itp.
- C. w przemyśle spożywczym: na powierzchniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt

QUATOVET może być aplikowany za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego, a także zamgławiaczy. Produkt stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas trwania zabiegu dezynfekcji, powierzchnie powinny być wilgotne.

Aplikacja w obecności zwierząt:

QUATOVET w zalecanych dawkach może być podawany w obecności wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych.

Uwaga: Zabieg powinien być wykonywany po usunięciu z pomieszczenia wody pitnej i paszy; aplikacja preparatu nie powinna obejmować powierzchni ciała zwierząt.

Dawka i stężenia skuteczne:**A. w obszarze weterynaryjnym:**

Działanie biobójcze	Zalecane stężenie		Minimalny czas działania	Temperatura
	oprysk ^{*)}	zamgławianie		
Bakterie	2%	4 l / 1 000 m ³	30 min	10°C
Grzyby drożdżopodobne	0,5%	1 l / 1 000 m ³	30 min	10°C

^{*)} W przypadku oprysku stosować 0,3 litra roztworu roboczego na powierzchnię 1m².

Preparat należy pozostawić na powierzchniach przez zalecany czas działania, następnie pomieszczenie wywietrzyć przez około 4h.

B. w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej oraz przemyśle spożywczym:

Działanie biobójcze	Zalecane stężenie	Minimalny czas działania	Temperatura
	oprysk ^{*)}		
Bakterie	0,25%	60 min	20°C
Grzyby (drożdżopodobne i pleśniowe)	4%	60 min	20°C

^{*)} W przypadku oprysku stosować 0,3 litra roztworu roboczego na powierzchnię 1m²



Preparat należy pozostawić na powierzchniach przez zalecany czas działania, a następnie dokładnie spłukać je wodą zdatną do picia.

C. w pustych szklarniach i tunelach poza cyklami hodowlanymi roślin:

Działanie biobójcze	Zalecane stężenie	Minimalny czas działania	Temperatura
	oprysk ^{*)}		
Bakterie	0,25%	60 min	20°C
Wirusy	0,5%	120 min	15°C
Grzyby (drożdżopodobne i pleśniowe)	4%	60 min	20°C

^{*)} W przypadku oprysku stosować 0,3 litra roztworu roboczego na powierzchnię 1m²

UWAGA! Zabieg przeprowadzać podczas nieobecności osób postronnych.

Środki ostrożności:**NIEBEZPIECZEŃSTWO****Produkt zawiera:**

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16))

Działa szkodliwie po połknięciu.

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nie wdychać gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwsza pomoc:

Wskazówki ogólne: Natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną preparatem.

Kontakt z oczami: Płukać oczy przez 15-20 minut wodą, trzymając rozchylone powieki. Chronić zdrowe oko. Natychmiast przetransportować poszkodowanego do okulisty lub szpitala.

Wdychanie: Gdy oddychanie jest utrudnione, dostarczyć tlen. Jeśli nastąpi zatrzymanie oddechu, przeprowadzić sztuczne oddychanie, wezwać lekarza. Wyprowadzić poszkodowane osoby z obszaru zagrożenia.

Kontakt ze skórą: Zwilżoną odzież i obuwie natychmiast zdjąć i usunąć. Miejsca podrażnione starannie zmyć dużą ilością wody.

Połknięcie: Natychmiast przepłukać usta, a następnie popić dużą ilość wody .

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające ze stosowania produktu: Produkt wykazuje silne działanie żrące na oko oraz działanie żrące na skórę i śluzówkę. Po połknięciu silne działanie żrące w rejonie jamy ustnej i gardła, możliwość perforacji przełyku i żołądka.

Postępowanie z odpadami:

Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji. Opakowanie nie powinno być ponownie używane. Preparatu i jego opakowania nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Odpady produktu, opakowania oraz odpady opakowaniowe powinny być przekazane firmie utylizującej odpady niebezpieczne.

Trwałość:

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcji.

Po otwarciu, zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Przechowywać szczelnie zamknięty, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze 8-25 °C.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy ściśle przestrzegać załączonych informacji o produkcie. Nieprzestrzeganie zaleceń może być szkodliwe.

Data produkcji:

Numer serii:

Data ważności: 3 lata od daty produkcji.

Producent:

EWABO Chemikalien GMBH & CO. KG

Kolpingstraße 4

49835 Wietmarschen

Niemcy

Tel. 059 25 99 33 0

Podmiot odpowiedzialny:

AGRO-TRADE Sp. z o.o.

Gowarzewo, ul. Akacyjowa 3

63-004 Tulce

Tel.: 61 820 85 95(6)

fax.: 61 820 86 70

info@agro-trade.com.pl

www.agro-trade.com.pl

2015 -11- 23

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Luczak