



**Urząd Rejestracji**  
**Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**  
 ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa, Polska; tel: +48 22 492-11-00, fax + 48 22-492-11-09  
 NIP 521-32-14-182                      REGON 015249601

## Charakterystyka Produktu Biobójczego

**1) Nazwa handlowa produktu biobójczego:**

Storm Pasta

**2) Nazwa i adres posiadacza pozwolenia:**

Nazwa	BASF Polska Sp. z o. o.
Adres	Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa

**3) Numer pozwolenia, data wydania pozwolenia i data jego wygaśnięcia:**

Numer pozwolenia	PL/2014/0112/MR
Data wydania pozwolenia	2014 -01- 2 2
Pozwolenie zachowuje ważność do dnia	30.09.2016r.

**4) Producent produktu biobójczego:**

Nazwa producenta	BASF Agro B.V., Arnhem (Holandia), Oddział Zurych	
Adres producenta	Im Tiergarten 7, 8055 Zurych, Szwajcaria	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego	Adres	Colkim s.r.l., Via Piemonte 50, Ozzano Emilia, Bologna, 40064 Włochy

**5) Producent substancji czynnej/czynnych**

Substancja czynna	Flokumafen	
Nazwa producenta	BASF Agro B.V., Arnhem (Holandia), Oddział Zurych	
Adres producenta	Im Tiergarten 7, 8055 Zurych, Szwajcaria	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego	Adres	Pentagon Fine Chemicals Limited Lower Road, Halebank Miasto: Widnes, Cheshire WA8 8NS, Wielka Brytania

- 6) Skład jakościowy i ilościowy z uwzględnieniem substancji czynnych i substancji niebędących substancjami czynnymi, o których wiedza jest niezbędna do właściwego stosowania produktu:

Nazwa powszechna	Nazwa IUPAC	Funkcja	Nr CAS	Nr WE	Zawartość
Flokumafen	4-hydroksy-3-[(1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> )-(1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluorometylobenzylloksy)fenylo]-1-naftylo)kumaryna	Substancja czynna	90035-08-8	421-960-0	0,005 g/100g

- 7) Postać użytkowa: pasta, przynęta gotowa do użycia

- 8) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności:

<b>Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (KE) 1272/2008</b>	
<b>Klasyfikacja</b>	
Kategoria zagrożenia	Nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie	Nie dotyczy
<b>Oznakowanie</b>	
Hasła ostrzegawcze	Nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie	Nie dotyczy
Środki ostrożności	EUH401 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Uwagi	Nie dotyczy
<b>Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG oraz dyrektywą 1999/45/WE</b>	
<b>Klasyfikacja</b>	
Znak ostrzegawczy i napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego	Nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie	Nie dotyczy
<b>Oznakowanie</b>	
Znak ostrzegawczy, symbol i napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego	Nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie	Nie dotyczy

Zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania	Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Uwagi	Nie dotyczy

### 9) Grupa produktowa i opis zastosowania:

Grupa produktowa	14
Opis zastosowania	Produkt przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków. Do użytku powszechnego i profesjonalnego.

### 10) Zwalczane organizmy szkodliwe:

szczur wędrowny (*Rattus norvegicus*), szczur śniady (*Rattus raptus*), mysz domowa (*Mus musculus*)

### 11) Dozowanie i instrukcje dotyczące sposobu stosowania:

#### Dozowanie

Użytkownik powszechny:

Zwalczanie myszy: 15 - 30 g przynęty (czyli 1 - 2 saszetki) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1 – 2 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników)

Zwalczanie szczurów: 45 – 60 g przynęty (czyli 3 - 4 saszetki) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 - 10 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników)

Użytkownik profesjonalny:

Zwalczanie myszy: 15 - 30 g przynęty (czyli 1 - 2 saszetki) w karmnikach deratyzacyjnych lub zabezpieczonych punktach z przynętą rozmieszczonych co 1 – 2 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników)

Zwalczanie szczurów: 45 – 60 g przynęty (czyli 3 - 4 saszetki) w karmnikach deratyzacyjnych lub w zabezpieczonych punktach z przynętą rozmieszczonych co 5 - 10 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników).

#### Sposób stosowania

Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.

**użytkownik powszechny:** Dozwolone jest jedynie stosowanie dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmników deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża.

**użytkownik profesjonalny:** Zaleca się stosowanie zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmników deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża.

W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.

Karmniki należy wyraźnie oznakować, tak aby było oczywiste, że zawierają one produkty gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować. Zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.

## 12) Kategorie użytkowników:

Powszechny, profesjonalny

## 13) Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach:

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

**Skutki uboczne:** zaburzenia krzepnięcia krwi, poważne ryzyko krwawienia, obfite krwotoki wewnętrzne prowadzące do śmiertelnej zapaści układu krążenia.

## 14) Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (w tym woda wykorzystana do mycia zanieczyszczonych produktem powierzchni), pozostałości produktu po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku) oraz padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

## 15) Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania:

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń i ptaków).

Okres trwałości produktu: do 2 lat od daty produkcji.

## 16) Inne informacje na temat produktu biobójczego:

### Ważne środki ostrożności

- Produkt stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą pitną, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
- Produktu w żadnym wypadku nie należy wykladać w sposób przypadkowy.
- Nie dopuścić do kontaktu produktu z innymi produktami.
- Chronić przynętę przed kontaktem z wodą.
- Zapobiegać powstawaniu pyłu.
- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji, produktem lub opakowaniem po produkcie.
- W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
- Należy prowadzić regularne (po 4, 7 dniach, i następnie co 7 dni ) inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta, uzupełniać przynętę zjedzoną i wymieniać każdą

przynętę uszkodzoną lub zanieczyszczoną. Jeżeli przynęta została całkowicie skonsumowana należy w danym punkcie zwiększyć liczbę punktów w tym obszarze. Przynętę znaną poza karmnikiem i padłe gryzonie należy usuwać, stosując rękawice ochronne.

#### **Dodatkowe obostrzenia dla użytkowników powszechnych:**

- Zaleca się nosić rękawice ochronne.
- Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. W przypadku tego typu produktów gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 21 dni w przypadku zwalczania myszy oraz 28 dni w przypadku zwalczania szczurów. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem deratyzacji.

#### **Dodatkowe obostrzenia dla użytkowników profesjonalnych:**

- Przy wyborze rodzaju produktu gryzoniobójczego należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na flokumafen to należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów.
- Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
- Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. (W przypadku tego typu produktów gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 21 dni w przypadku zwalczania myszy oraz 28 dni w przypadku zwalczania szczurów. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności ich zwalczania.)
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

#### **Rodzaj i wielkość opakowania**

##### Użytkownik powszechny:

1. Do 1,5 kg przynęty pakowanej w oddzielne saszetki (PP/PE, papier, papier wyścielany PP/PE lub aluminium) zawierające 15 g pasty lub porcje przynęty o masie do 60 g (tzn. 3-4 saszetki o masie 15 g każda, pakowane w torebkę z PP/PE), a następnie umieszczone w opakowaniach:

- Plastikowe (PP/HDPE/PET/PE/PA) wiaderka, butelki, torby, zamykane przy użyciu plastikowej (PP/PE/LDPE) pokrywy lub zgrzewane
- Torby papierowe laminowane

2. Do 1,5 kg przynęty w fabrycznie pakowanych karmnikach deratyzacyjnych (zawierających do 60 g przynęty), pakowanych w laminowany papier, plastikowe opakowanie, karton lub torbę z tworzywa sztucznego.

##### Użytkownik profesjonalny:

1. Do 25kg przynęty pakowanej w oddzielne saszetki (PP/PE, papier, papier wyścielony PP/PE lub aluminium) zawierające 15 g pasty lub porcje przynęty o masie do 60 g (tzn. 3-4 saszetki o masie 15 g każda, pakowane w torebkę z PP/PE), a następnie umieszczone w opakowaniach:

- Plastikowe (PP/HDPE/PET/PE/PA) wiaderka, butelki, torby, zamykane przy użyciu plastikowej (PP/PE/LDPE) pokrywy lub zgrzewane
- Torby papierowe laminowane

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych  
Wyrobnów Medycznych  
i Produktów Biobójczych  
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa  
Regon: 015249601

Z upoważnienia Prezesa  
WICEPREZES  
ds. Produktów Biobójczych  
Barbara Jaworska-Łuczak